LT

Šaltoji sterilizavimo priemonė
skirta invaziniams medicininiams įtaisams
peroksiacto rūgšties milteliai

PAVOJUS

Savybės

GERMOCID POLVERE sudėtyje yra pirminės peroksiacto rūgšties, kuri suaktyvinama ištirpinus miltelius drungname vandenyje; milteliai visiškai ištirpsta nepalikdami jokių likučių ant dugno ir be putų ant paviršiaus. Iš pradžių, maždaug po penkiolikos minučių, žydros spalvos skystis tampa bespalvis būtent tiek laiko reikia, kad veiklioji medžiaga (peroksiacto rūgštis) išsiskirtų ir tirpalas būtų paruoštas naudoti ir turėtų didelį baktericidinį potencialą. GERMOCID POLVERE gali būti naudojamas kaip invazinių medicininių prietaisų gydymo įstaigose, medicinos ir odontologijos ambulatorijose nukenksminimo, dezinfekavimo, sporicidinio poveikio, šaltasis sterilizatorius. Taip pat, produktas gali būti naudojamas estetiniais tikslais neinvaziniuose prietaisuose. GERMOCID POLVERE taip pat veiksmingas kaip nukenksminimo priemonė, skirta dezinfekuoti ir greitai šaltai sterilizuoti temperatūrai jautrias medžiagas, tokias, kaip: endoskopus, optinius pluoštus, keitiklius ir t.t. Visiškas komponentų suderinamumas reiškia, kad GERMOCID POLVERE gali būti naudojamas endoskopų valymo mašinose. Panaudoti tirpalai gali būti šalinami kaip nepavojingos atliekos.

Naudojimas: Mirkymo tirpalo paruošimas: į atitinkamą vonelę įpilkite drungno vandens, kad milteliai lengviau tirptų, įsitikinkite, kad temperatūra yra apie 35 °C; remiantis pageidaujamu aktyvumu, įberkite reikiamą dozę; maišykite tirpalą tol, kol susidarys skaidrus žydras tirpalas; prieš naudodami tirpalą palaukite 15 minučių. **Nukenksiminimas / dezinfekcija:** naudokite 8 g litrui vandens, įmerkite instrumentus į tirpalą 10 minučių; jei lieka organinių likučių, plaukite naudodami tam skirtą ploviklį; išmirkinus instrumentus, išimkite juos ir nuskalaukite; aprašyto veikimo atveju tirpalas išlieka aktyvus iki 7 dienų nuo paruošimo (priklausomai nuo apdorotų instrumentų kiekio). **Sporicidinis poveikis:** naudokite 8 g litrui vandens, įmerkite instrumentus į tirpalą 10 minučių; aprašyto veikimo atveju tirpalas, ilgiausiai, išlieka aktyvus 24 valandas nuo paruošimo. **Aukšto lygio dezinfekcija / Šaltas sterilizavimas:** naudokite 16 g litrui vandens, įmerkite instrumentus į tirpalą 10 minučių; baigę mirkyti, išimkite instrumentus ir nuskalaukite naudodami sterilizuotą vandenį; nusausinkite ir sandėliuokite aseptinio konservavimo būdu; aprašyto veikimo atveju tirpalas, ilgiausiai, išlieka aktyvus 24 valandas nuo paruošimo.

Sudedamos dalys: 100 gramų produkto yra: 25,00 g tetraacetiletilendiamino; 42,00 g natrio peroksokarbonato; koformuliantai pagal poreikį 100,00 g.

Įspėjimai: H302 Kenksminga prarijus. **H318** Smarkiai pažeidžia akis. **P264** Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. **P280** Dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. **P305-P351-P338** PATEKUS Į AKIS:: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P310** Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. **Sudėtyje yra:** NATRIO PEROKSIKARBONATAS. Nenaudokite instrumentams, pagamintiems iš aliuminio ir nikelio lydinių. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Nenaudokite metalinėse vonelėse. Naudoti profesionaliai.

Suderinamumas su medžiagomis: GERMOCID POLVERE puikiai dera su daugeliu medžiagų, iš kurių gaminami įvairūs gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigose naudojami prietaisai. GERMOCID POLVERE / ir medicininio prietaiso suderinamumo tyrimai rodo, kad naudojant GERMOCID POLVERE rekomenduojamomis naudojimo sąlygomis medicinos prietaiso būklė nepasižymi suprastėjimu.
Galiojimo laikas ir konservavimas: Produktas galioja 2 metus nuo pagaminimo datos ir turi būti laikomas originalioje pakuotėje. Jei pakuotė buvo atidaryta ir vėliau taisyklingai uždaroma po kiekvieno paėmimo, tuo pačiu neužteršiant likučio išorinėmis medžiagomis ir (arba) išoriniais agentais, preparatas galioja tol, kol produktas sunaudojamas. Produktas neatsparus drėgniui. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir atokiau nuo šilumos šaltinių. Nenaudokite, jei pakuotė pažeista.
Partija ir galiojimo laikas: žiūrėkite ant pakuotės
MEDICINOS PRIETAISAS PAŽENKLINTAS „CE“ 0546 Europos direktyva 93/42/EEB
Gamintojas: GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938 www.germo.it - info@germodis.com PAGAMINTA ITALIJOJE
Dėl produkto saugos duomenų lapo naujinimų įspėjimai gali keistis